

RESULTATS PRELIMINAIRES DE L'INTRODUCTION DES OVINS BENI-GUIL DANS LA ZONE D'OUARZAZATE

Par :Dr EZZAHIRI Ahmed

(1982)

1. Buts de l'opération

Le bassin d'Ouarzazate qui s'étend de la ville d'OUARZAZATE jusqu'à Tinghir est caractérisé par la présence d'un type d'ovine appelé Saghro. A part son adaptation aux conditions du climat et du relief de la zone, ses performances sont très médiocres. C'est un animal de petite taille, adapté à la marche sur de grandes distances, sa laine et sa viande sont de très mauvaises qualités.

En vue d'améliorer ses performances, parallèlement à l'amélioration des parcours dans la zone, l'ORMVA d'Ouarzazate a introduit des béliers de race Beni-Guil, qui évoluent dans les mêmes conditions que l'ovine Saghro, mais dont la viande est de meilleure qualité..

L'amélioration des ovines locales se fera ainsi par le croisement entre les deux races.

2. Introduction des béliers Beni-Guil

En Août 1981, il a été procédé à la distribution de 93 béliers de race Beni-Guil provenant de l'Oriental, à l'occasion du concours de l'élevage, organisé au profit des éleveurs de Skoura, Kelâa Mgouna, Boulmane et Tinghir (Tableau n° 1).

Ces éleveurs ont été liés à l'ORMVAO par un contrat qui permet à ce dernier de procéder aux contrôles nécessaires chez les éleveurs dans les meilleures conditions, afin d'évaluer convenablement les résultats de croisement avec les brebis locales.

3. Résultats

Après une année, les résultats suivants ont été enregistrés :

3.1. Comportement des éleveurs

Tous les éleveurs des différentes régions qui ont bénéficié de ces béliers ont respecté les contrats passés avec l'ORMVA. En raison de la sécheresse qui a sévi pour la deuxième année consécutive dans la zone, de nombreux éleveurs ont gardé le bélier à la bergerie, en attendant l'amélioration des conditions climatiques pour le laisser sortir avec les brebis (Tableau n°2).

3.2. Performances pondérales

Les poids enregistrés chez ces béliers varient entre 26 et 33 kg pour les béliers en stabulation permanente et ont été de 28 kg pour les béliers en transhumance à l'exception de ceux de Tinghir où tous les animaux ont enregistré des poids de 40 kg (Tableau n°2).

Les poids des animaux transhumants ne diffèrent pas significativement de ceux enregistrés à leur arrivée à l'exception de ceux de Tinghir.

3.3. Mortalités

Comme chez toutes les espèces et races animales, on a aussi noté des mortalités chez ces béliers qui sont dues en général à une sous-alimentation (Tableau n°3).

Il faut signaler que la sécheresse qui a sévi dans le région a causé des dégâts très sérieux. Les mortalités ont dépassé 10% de l'effectif régional et les avortements ont été observés chez plus de 50% des femelles reproductrices.

3.4. Reproduction

L'agnelage n'a pas eu lieu cette année en raison du fait :

- .que les brebis n'ont pas pu subvenir à leurs besoins d'entretien. Ceci se traduit par des mortalités excessives chez les animaux adultes et des taux d'avortements élevés.
- que la plupart des béliers sont restés en stabulation permanente et isolés du reste du troupeaux.

Il faut noter que les éleveurs ayant bénéficié des béliers de race Beni-Guil étaient choisis parmi les meilleurs de la région et par conséquent adoptaient des systèmes de production animale plus rationnels. C'est ainsi que la plus part d'entre eux ne procédaient pas à la lutte pendant les années sèches.

Cependant il y a quelques brebis qui ont été saillies par certains béliers Beni-Guil, surtout dans la région de Tinghir, et ont donné lieu à la naissance de 8 agneaux (5 males et 3 femelles).

Ces produits ont fait l'objet de contrôles continus pour pouvoir juger valablement leur évolution et les comparer avec les résultats obtenus chez les produits locaux. (Leurs homologues issus des animaux Saghro).

En raison du faible effectif des produits issus du croisement, il n'était pas possible de procéder à la comparaison de ces produits avec les locaux.

4. Conclusion

Malgré les conditions climatiques difficiles (sécheresse de l'année d'essai), on a constaté que dans l'ensemble les béliers Beni-Guil ont résisté de la même manière que les locaux.

Par ailleurs, l'essai sera poursuivre au cours de la deuxième année, pour permettre d'évaluer, les résultats du croisement.

Tableau n°1 : Répartition des béliers de race Beni-Guil Distribués aux éleveurs selon les régions

Région	Skoura	Kelâa Magouna	Boumalne	Tinghir	Total
Nombre de béliers	33	20	20	20	93
Nombre d'éleveurs bénéficiaires	33	20	20	20	93

Tableau n°2 : Mode de conduite et performances pondérales des béliers Beni-Guil (KG)

Zone	Skoura		Kelâa maguona		Boumalne		Tinghir		moyenne	
	Nbre	kg	Nbre	kg	Nbre	kg	Nbre	kg	Nbre	kg
Béliers en stabilisation permanente	15	32,5	2	33,6	16	26,4	7	41,3	40	31,6
Béliers en transhumance	11	28,3	17	28,6	3	-	6	40,5	37	30,6

Tableau n°3 : Répartition des mortalités

Régions	Skoura	Kelâa Magouna	Boumalne	Tinghir	Total
Nombre de béliers	7	0	1	7	15
% par rapport au nombre total distribué	21,2	0	5	35	16,1
Cause	Sous alimentation		Sous alimentation	Sous alimentation	